

# TOUS ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA VACCINATION DES PATIENTS FRAGILES

# Vaccination Coqueluche



## Public cible

### Recommandations générales



**Nourrissons**

**OBLIGATOIRE**  
depuis janvier 2018

### Recommandations particulières



**Femmes enceintes**  
entre 20 et 36 SA à chaque grossesse



**Entourage des nourrissons**  
Stratégie du cocooning si absence de vaccination pendant la grossesse ou < 1 mois avant la naissance

### Professionnels



Pour plus d'info

## Risques

### CONTAGIOSITE +++

En 2024 :

- Recrudescence des cas
- Déjà **28 décès** pour le 1er semestre !

**Nourrissons non vaccinés < 6 mois** sont à risque de **formes graves**

### ⚠ Complications de la coqueluche

- Quinte asphyxiante, apnée, bradycardie profonde
- Coqueluche maligne : détresse respiratoire, défaillance multi-viscérale  
→ Risque ++ chez nourrisson < 3 mois
- Encéphalopathie coquelucheuse (rare)

## Couverture vaccinale

Professionnels de santé : **50 à 73 %**

Nourrissons : **90,9 %** à 3 doses → Pourtant **OBLIGATOIRE** pour tous

Femmes enceintes : **< 20 %**

Cocooning : **42 à 59 %**

Données HAS  
2024

## Conduite à tenir autour d'un cas



*Découvrez la  
conduite à tenir !*



## Nouveautés

### Recommandations HAS Juillet 2024 :

Si dernière injection > 5 ans, dose de rappel pour :

- Entourage proche du nouveau/né nourrisson
- Tous les professionnels travaillant au contact des nouveau-nés et nourrissons < 6 mois

Il n'existe **PAS de vaccin anticoquelucheux seul**  
et le vaccin DTP sans valence coqueluche n'est plus commercialisé

→ Il faut donc réaliser une **vaccination combinée**

**1 mois de délai** entre les vaccins si la coqueluche doit être refaite :  
**pas de risque pour le patient**

Une **infection évitée**, c'est souvent une **antibiothérapie épargnée** !