

Situations spécifiques

Femmes enceintes

Avant la grossesse :

ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole)

Les virus de rougeole et rubéole peuvent entraîner des **fausses-couches** et des **malformations**.

2 doses si non fait dans l'enfance.

Varicelle

Contractée pendant la grossesse, elle est dangereuse pour la mère et l'enfant. 2 doses de vaccin pour toutes les femmes n'ayant pas eu la varicelle.

Pendant la grossesse :

Grippe et Covid

La grippe et le covid peuvent provoquer : complications respiratoires, fausses-couches et prématuré. Le vaccin est recommandé à chaque grossesse, et est sans danger !

Coqueluche (dTcaP)

Les quintes de toux peuvent provoquer des contractions utérines chez la femme enceinte. L'infection des poumons est parfois mortelle chez le nourrisson. 1 dose à chaque grossesse entre 20 et 36 SA.

VRS

Le virus respiratoire syncytial est responsable de bronchiolites parfois graves chez les nourrissons. 1 dose entre 32 et 36 SA de septembre à janvier

Après la grossesse :

Coqueluche (dTcaP)

1 dose si non vaccinée pendant la grossesse

ROR

1 dose si sérologie rubéole négative.


Personnes avec un IMC ≥ 40 *

Grippe

Le risque de grippe sévère est élevé. Vaccin recommandé tous les ans, si possible avant fin novembre.

* $IMC = P/T^2$ (Poids en Kg, taille en m)

Calendrier vaccinal



Calendrier simplifié des vaccinations

Où faire mes vaccins ?

- Chez mon médecin traitant ou mon spécialiste
- Chez mon pharmacien, mon infirmière ou ma sage-femme
- Dans un Centre de Vaccination Publique (CVP) :
 - A Montpellier : CVP Hérault, Institut Bouisson Bertrand, cvp34ibb@bouisson-bertrand.fr / Tél. : 04 34 08 73 65
 - A Béziers : Centre Vaccination, Caserne St Jacques, centre.vaccination@beziers.fr / Tél. : 04 67 36 81 00

Conception



Promu par



MAJ : 10/2024

Réalisation : Service Communication : 04 67 33 93 43 - G. F. -

Vaccination : Tous concernés !



Parlez-en à un professionnel de santé : médecin, pharmacien, sage-femme, infirmier.



Les vaccins sont adaptés à votre situation

Plus d'infos sur : www.mesvaccins.net / vaccination-info-service.fr / infovac.fr



Institut Bouisson Bertrand
Fondation de la faculté de médecine de Montpellier - Nîmes

Adolescents

■ Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche

Rappel entre 11 et 13 ans.

■ Méningites et septicémies à méningocoque

Méningocoque ACWY : 1 dose entre 11 et 14 ans.
Rattrapage de 15 à 24 ans (remboursement courant 2024).

Méningocoque B : 2 doses (M0,2) entre 13 et 15 ans
(non remboursé, recommandé par Infovac)

■ Infections à Papillomavirus humain (HPV)

Pour tous les jeunes jusqu'à 19 ans et pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes jusqu'à 26 ans.

Schéma : M0,6 entre 11 et 14 ans, M0, 2, 6 dès 15 ans.

■ Hépatite B

Rattrapage pour tous les adolescents non vaccinés. 2 doses de 20µg à 6 mois d'intervalle entre 11 et 15 ans.

■ ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole)

2 doses sont nécessaires pour tous afin d'être bien protégés.

■ Varicelle

2 doses entre 12 et 18 ans pour ceux n'ayant jamais eu la varicelle.



Adultes

■ Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche (dTcaP)

A 25, 45 et 65 ans.

Et

Pour l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois « stratégie du cocooning », si mère non vaccinée pendant la grossesse ou accouchement < 1 mois post vaccination :

- Ados et adultes < 25 ans : 1 dose si dernier rappel > 5 ans

- Adultes ≥ 25 ans : 1 dose si dernier rappel > 10 ans

■ Méningites et septicémies à méningocoque

Méningocoque ACWY : 1 dose entre 11 et 14 ans.
Rattrapage jusqu'à 24 ans (remboursement courant 2024).

Méningocoques B : 2 doses (M0,M2) jusqu'à 24 ans
(Non remboursé, recommandé par Infovac)

■ Hépatite B

Pour les adultes non vaccinés et exposés à un risque accru de contamination : parlez-en avec votre médecin.

■ ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole)

2 doses au total pour ceux nés après 1980.

■ Varicelle

2 doses pour les femmes en âge de procréer n'ayant jamais eu la varicelle.

Les plus de 65 ans

■ Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche A 65 ans puis tous les 10 ans.

■ Zona (vaccin inactivé Shingrix®)

2 doses (M0,M2), pour tous dès 65 ans.

Délaï après un zona (ou un vaccin Zostavax®) :

- 1 an ou

- dès guérison si traitement immunosuppresseur (IS) à débiter.

Schéma M0,M1 possible pour terminer le schéma 14j avant traitement IS.

■ Grippe, Covid et VRS

Les virus grippe, Covid et VRS (responsable des bronchiolites de l'enfant) entraînent des complications plus fréquentes et sévères avec l'âge. La vaccination grippe et Covid est recommandée dès 65 ans, tous les ans, si possible avant fin novembre.

Pour les plus de 80 ans, 1 dose de rappel Covid est conseillée au printemps.

Recommandation HAS 2024 pour le VRS, 1 seule dose si :

- ≥ 75 ans

- ≥ 65 ans et pathologie chronique respiratoire ou cardiaque

■ Pneumocoque

Le vaccin est recommandé pour les personnes les plus à risque : diabète, insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale, maladies du foie, immunodépression...

