

Vaccins	Modalités	Rappels
Fièvre jaune	1 injection (au moins 10 jours avant le départ)	10 ans après, si nouveau séjour, en particulier si : - Vacciné pendant une grossesse ou en situation d'immunodépression - Vacciné avant l'âge de 2 ans (à faire dès l'âge de 6 ans) - Circulation active du virus dans la région visitée
Hépatite A	<u>2 injections</u> : - 1 injection 4 semaines avant le départ ; - rappel : à partir de 6 mois après la 1 ^{ère} injection.	Aucun sauf en cas d'immunodépression
Hépatite B	<u>3 injections</u> : - 2 doses à 1 mois d'intervalle ; 3 ^{ème} dose 5 mois après la 2 ^{ème} - schéma rapide avec 3 injections en 3 semaines (J0,J7,J21), rappel à 1 an - 2 injections à 6 mois d'intervalle entre 11 et 15 ans avec le vaccin adulte	Aucun sauf cas particuliers (immunodépression, exposition professionnelle)
Typhoïde	1 injection (au moins 10 jours avant le départ)	3 ans après si nouveau séjour à risque
Méningocoques (ACYW135)	1 injection (au moins 10 jours avant le départ)	10 ans après si nouveau séjour à risque (5 ans si immunodépression)
Encéphalite japonaise	<u>2 injections</u> : - 1 injection si possible 6 semaines avant le départ - 2 ^{ème} injection 4 semaines après la 1 ^{ère} injection (1 semaine si départ imminent et adulte)	1 à 2 ans après si nouveau séjour à risque, puis 10 ans après
Encéphalite à tiques	<u>3 injections</u> : - 1 injection si possible 2 mois avant le départ (minimum 2 semaines); - 2 ^{ème} injection 1 mois après la 1 ^{ère} injection (voire 2 semaines); - 3 ^{ème} injection au moins 4 mois après la 2 ^{ème} injection.	3 ans après, puis tous les 5 ans
Rage	<u>2 injections</u> : - 1 injection au moins 1 mois avant le départ ; - 2 ^{ème} injection 7 jours après la 1 ^{ère} injection ;	Aucun, sauf en cas d'exposition (2 rappels à 3 jours d'intervalle dans les 5 jours suivant une exposition)

NB : la mise à jour des vaccins du calendrier vaccinal français est indispensable pour les adultes comme pour les enfants